

*Wir schützen
Ihre Gesundheit.*



Dr. Schumacher



Für jeden Fall **die richtige** **Händedesinfektion**

ASEPTOMAN® PARFÜMFREI, ASEPTOMAN® MED,
ASEPTOMAN® FORTE, ASEPTOMAN® VIRAL, DESCODERM



Jederzeit gut geschützt

Händedesinfektion und Infektionsschutz. Beides gehört in Gesundheitseinrichtungen untrennbar zusammen. Abhängig von Einsatzgebiet und Anwender müssen Händedesinfektionsmittel jedoch unterschiedliche Anforderungen erfüllen.

Ob für die Routine, den OP oder im Ausbruchsfall – die Dr. Schumacher GmbH hält für alle Herausforderungen ein passendes Händedesinfektionsmittel bereit. Dabei können die Anwender zwischen propanolischen und ethanolischen Produkten wählen. Die Wirksamkeit der Händedesinfektionsmittel ist nach nationalen und europäischen Normen geprüft. Die strengen Prüfungen nach VAH, DVV und RKI, IHO, ÖGHMP und EN gewährleisten eine maximale Qualität der Präparate.

Gleichzeitig punktet das Sortiment zur Händedesinfektion mit einer ausgezeichneten Hautverträglichkeit. Die Auswahl an farbstoff- und parfümfreien Händedesinfektionsmitteln berücksichtigt auch die Ansprüche besonders empfindlicher Haut. Rückfettende und pflegende Inhaltsstoffe sorgen für ein spürbar angenehmes Hautgefühl.

Die Qualitätsprodukte der Dr. Schumacher GmbH haben sich bereits seit Jahrzehnten im Gesundheitswesen bewährt. Anwender setzen die Händedesinfektionsmittel gerne ein. Das stärkt die Bereitschaft zur Händedesinfektion und trägt damit wiederum zu einem besseren Infektionsschutz bei.

Inhalt

Echt starke Typen: Händedesinfektion für jede Herausforderung	4
ASEPTOMAN® MED	6
ASEPTOMAN® FORTE	8
ASEPTOMAN® PARFÜMFREI	10
ASEPTOMAN® VIRAL	12
DESCODERM	14
Viruswirksamkeiten schnell erkennen	16
Pflichttextangaben	17
Produkteigenschaften auf einen Blick	18
Bestellinformationen	19

Echt starke Typen Händedesinfektion für jede Herausforderung

ASEPTOMAN® MED Der Partner für die Routine

Begrenzt viruzid PLUS wirksam und daher ganzjährig einsetzbar – dabei absolut hautfreundlich: **ASEPTOMAN MED** ist der ideale Partner für die hygienische Händedesinfektion in der täglichen Routine.



ASEPTOMAN® FORTE Der Extrastarke für den Risikobereich

In 30 Sekunden viruzid wirksam nach EN 14476: **ASEPTOMAN FORTE** wirkt schnell und besonders stark. Damit sorgt das Händedesinfektionsmittel für umfassenden Schutz in Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko.



ASEPTOMAN® VIRAL Der Sprinter bei angeordneter Desinfektion

Schnell, schneller, **ASEPTOMAN VIRAL**.
An diesem Händedesinfektionsmittel
kommt keiner vorbei – in 1 Minute
viruzid wirksam nach RKI/DVV.
Außerdem: RKI A/B-gelistet eignet
sich **ASEPTOMAN VIRAL** bei behörd-
lich angeordneter Desinfektion.

DESCODERM Der Purist für sensible Haut

Händedesinfektion pur: **DESCODERM** macht's
möglich. Das Präparat kommt ohne kumu-
lierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige
Zusatzstoffe aus. Dermatologisch empfohlen
für haut- bzw. allergieempfindliche Personen.

ASEPTOMAN® PARFÜMFREI Der Profi für Alltag und OP

ASEPTOMAN PARFÜMFREI hat sich bestens
bewährt in der Langzeitanwendung. Mit
seiner ausgezeichneten Qualität eignet
sich das Händedesinfektionsmittel ideal
als professioneller Begleiter für den Einsatz
als professioneller Begleiter für den Einsatz
im Alltag und im OP.



Der Partner für die Routine

ASEPTOMAN® MED

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis

VAH*

IHO



ASEPTOMAN MED ist der ganzjährige Partner für die hygienische Händedesinfektion in der Routine. Der Clou: Die intelligent abgestimmte Rezeptur verbindet einen niedrigen Alkoholgehalt mit rückfettenden, pflegenden Inhaltsstoffen. Auch gut: **ASEPTOMAN MED** ist frei von Parfüm und kumulierenden Langzeitwirkstoffen.

- **Begrenzt viruzid PLUS**
- **Wirksam gegen Norovirus (MNV) in 30 Sekunden**
- **Schnell und umfassend wirksam, hervorragende Hautverträglichkeit**

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Geeignet für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen

Wirkungsspektrum

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS

Wirkstoff pro 100 g

Ethanol 65 g

Wirkpektrum und Einwirkzeiten		30 s	1 min	1,5 min	2 min
Anwendungsempfehlung					
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion**	VAH* / EN 1500	•			
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion**	EN 12791				•
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	•			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	•			
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 17430***	•			
begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 17430***	•			

Wirkpektrum und Einwirkzeiten		15 s	30 s	1 min	1,5 min	2 min
Ergänzende Prüfergebnisse						
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476		•			
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476		•			
bakterizid	EN 13727		•			
	EN 1040	•				
levurozid (Candida albicans)	EN 13624		•			

* VAH-gelistet zur hygienischen Händedesinfektion mit 30 Sekunden Einwirkzeit

** einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

***Norm-Entwurf prEN 17430:2019, Viruzide hygienische Händedesinfektion – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Der Extrastarke für den Risikobereich

ASEPTOMAN® FORTE

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis

VAH

IHO



ASEPTOMAN FORTE überzeugt mit seiner extrastarken Wirksamkeit. Damit ist das Händedesinfektionsmittel ideal für den Infektionsschutz in Risikobereichen geeignet. On top punktet **ASEPTOMAN FORTE** mit seinem ausgewogenen Rückfettungssystem, das die Hautfeuchtigkeit nachweislich erhöht.

- **Viruzid in 30 Sekunden gemäß EN 14476**
- **Parfümfrei, besonders hautpflegend mit Glycerin und Rückfetter**
- **Chirurgische Händedesinfektion in 1,5 Minuten**

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Geeignet für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen.

Wirkungsspektrum

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS, viruzid

Wirkstoff pro 100 g

Ethanol 85 g

Wirkpektrum und Einwirkzeiten		30 s	1 min	1,5 min	2 min
Anwendungsempfehlung					
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion*	VAH / EN 1500	•			
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion*	VAH / EN 12791			•	
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	•			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	•			
fungizid (Aspergillus brasiliensis)	EN 13624			•	
viruzid	EN 14476 / EN 17430**	•			
begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro- und Adenoviren)	EN 14476 / EN 17430**	•			

Wirkpektrum und Einwirkzeiten		15 s	30 s	1 min	1,5 min	2 min
Ergänzende Prüfergebnisse						
wirksam gegen Polioviren	EN 14476		•			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476		•			
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	•				
bakterizid	EN 13727	•				
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	•				

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

**Norm-Entwurf prEN 17430:2019, Viruzide hygienische Händedesinfektion – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Der Profi für Alltag und OP

ASEPTOMAN® PARFÜMFREI

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Propanolbasis

VAH

ÖGHMP

IHO



ASEPTOMAN PARFÜMFREI ist der erfahrene Profi für die Händedesinfektion im Alltag und im OP. Das Händedesinfektionsmittel überzeugt mit einer angenehmen Haptik. Hochwertige, rückfettende Inhaltsstoffe sorgen für ein spürbar gutes Hautgefühl. **ASEPTOMAN PARFÜMFREI** ist auch beliebt bei Anwendern mit empfindlicher Haut.

- **Bakterizid, tuberkulozid, levurozid**
- **Begrenzt viruzid, inkl. Influenza- / Coronaviren**
- **Parfümfrei, enthält rückfettende Substanzen**

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Geeignet für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen.

Wirkungsspektrum

Bakterizid, mykobakterizid levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid

Wirkstoff pro 100 g

2-Propanol 63,14 g

Wirkpektrum und Einwirkzeiten		30 s	1 min	1,5 min	2 min
Anwendungsempfehlung					
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion*	VAH / EN 1500	•			
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion*	VAH / EN 12791			•	
begrenzt viruzid	RKI / DVV inkl. HBV / HIV / HCV	•			
	EN 14476	•			
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	•			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	•			

Wirkpektrum und Einwirkzeiten		15 s	30 s	1 min	1,5 min	2 min
Ergänzende Prüfergebnisse						
wirksam gegen Coronaviren (bovines Coronavirus)	EN 14476		•			
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	•				
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476			•		
bakterizid	EN 13727	•				
	EN 1040	•				
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	•				
	EN 1275	•				

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Pflichttextangaben nach § 4 Heilmittelwerbegezet (HWG) siehe S. 17

Der Sprinter bei angeordneter Desinfektion

ASEPTOMAN® VIRAL

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis

VAH

RKI / DVV

RKI A / B

IHO



ASEPTOMAN VIRAL ist der Sprinter in der Händedesinfektion, wenn es um den Wirkungsbereich A / B geht. Grund für die außergewöhnlich kurzen Einwirkzeiten: Die leistungsstarke Wirkstoffkombination aus Ethanol und n-Propanol. Hautpflegende Inhaltsstoffe runden das Powerpaket ab.

- **RKI gelistet Wirkungsbereich A / B**
- **Geprüfte Hautverträglichkeit**
- **Mit Rückfetter und Feuchthaltemittel**

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Geeignet für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen.

Wirkungsspektrum

Bakterizid (inkl. Mykobakterien), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS, viruzid (wirksam gegen alle behüllten und unbehüllten Viren) gemäß RKI / DVV-Leitlinien

Wirkstoff pro 100 g

10 g 1-Propanol (Ph. Eur.) und 57,6 g Ethanol 96 %

Wirkpektrum und Einwirkzeiten		30 s	1 min	1,5 min	2 min
Anwendungsempfehlung					
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion*	VAH / EN 1500	•			
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion*	VAH / EN 12791			•	
Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG**	RKI Wirkungsbereich A	•			
Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG**	RKI Wirkungsbereich B		•		
viruzid	RKI / DVV		•		
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	•			
begrenzt viruzid	RKI / DVV	•			
tuberkulozid (M. terrae)	VAH	•			

Wirkpektrum und Einwirkzeiten		15 s	30 s	1 min	1,5 min	2 min
Ergänzende Prüfergebnisse						
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476		•			
wirksam gegen Adenoviren	RKI / DVV		•			
	EN 14476		•			
wirksam gegen SV40 / Papova- / Polyomaviren	RKI / DVV		•			
wirksam gegen Rotaviren	RKI / DVV	•				
wirksam gegen Polioviren	RKI / DVV			•		
wirksam gegen Vacciniaviren	RKI / DVV	•				
wirksam gegen BVDV	RKI / DVV	•				
bakterizid	EN 13727	•				
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	•				

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

** gem. RKI-Leistungsbescheid

Pflichttextangaben nach § 4 Heilmittelwerbegezet (HWG) siehe S. 17

Der Purist für sensible Haut

DESCODERM

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Propanolbasis

VAH

RKI A

ÖGHMP

IHO



DESCODERM steht für pure Qualität in der Händedesinfektion: keine Farbstoffe, kein Parfüm, keine kumulierenden Langzeitwirkstoffe oder sonstigen Zusatzstoffe. Daher empfiehlt sich **DESCODERM** ganz besonders für die routinemäßige Händedesinfektion haut- bzw. allergieempfindlicher Personen.

- **Bakterizid, levurozid, tuberkulozid**
- **Begrenzt viruzid**
- **Parfümfrei, frei von potenziell allergisierenden Zusatzstoffen**

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Geeignet für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen.

Wirkungsspektrum

Bakterizid, mykobakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid

Wirkstoff pro 100 g

2-Propanol 63,1 g

Wirkspektrum und Einwirkzeiten		30 s	1 min	1,5 min	2 min
Anwendungsempfehlung					
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion*	VAH / EN 1500	•			
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion*	VAH / EN 12791			•	
Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG	RKI	•			
Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG**	RKI	•			
begrenzt viruzid	RKI / DVV	•			
	EN 14476	•			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	•			

Wirkspektrum und Einwirkzeiten		15 s	30 s	1 min	1,5 min	2 min
Ergänzende Prüfergebnisse						
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	•				
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476			•		
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	•				
bakterizid	EN 13727	•				
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	•				

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Pflichttextangaben nach § 4 Heilmittelwerbegesetz (HWG) siehe S. 17

Viruswirksamkeiten schnell erkennen

Dr. Schumacher Hygienelevel

Nicht erst seit der Corona-Pandemie geht von Viren ein erhebliches Infektionsrisiko aus. Damit Anwender die jeweilige Viruswirksamkeit schnell erkennen und das passende Produkt auswählen können, hat die Dr. Schumacher GmbH eine farbliche

Codierung für seine Desinfektionsmittel entwickelt. Die farblich codierten Hygienelevel **PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT** spiegeln die drei Wirkungsspektren begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS und viruzid wider.

PREVENT LEVEL

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, **begrenzt viruzid**

Behüllte Viren sind von einer Lipidhülle umgeben. Die Virushülle bietet einen Angriffspunkt und kann durch Desinfektionsmittel leicht zerstört werden. Benötigtes Wirkungsspektrum: begrenzt viruzid.

Testviren: Vacciniavirus Elstree / Modified Vacciniavirus Ankara (MVA) und Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV), Surrogatvirus für Hepatitis C.

PRESERVE LEVEL

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, **begrenzt viruzid PLUS**

Unbehüllte Viren sind stabiler als behüllte Viren. In dieser Gruppe gibt es jedoch einige Viren (Noro-, Rota- und Adenoviren), die nicht so widerstandsfähig sind wie andere unbehüllte Viren. Benötigtes Wirkungsspektrum: begrenzt viruzid PLUS (inkl. begrenzt viruzid).

Testviren: Adenovirus (Typ 5, Stamm Adenoid 75) und Murines Norovirus (MNV, Stamm S99 Berlin).

PROTECT LEVEL

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, **viruzid**

Die besonders widerstandsfähigen, unbehüllten Viren werden durch hochwirksame Desinfektionsmittel inaktiviert. Dabei können auch höhere Konzentrationen des Produkts und längere Einwirkzeiten erforderlich sein. Benötigtes Wirkungsspektrum: viruzid (inkl. begrenzt viruzid und eine begrenzt viruzid PLUS).

Testviren: Adenovirus (Typ 5, Stamm Adenoid 75), Murines Norovirus (MNV, Stamm S99 Berlin), Poliovirus (Typ I, Stamm LSc-2ab) und Polyomavirus SV40 (Stamm 777, Surrogat für HPV).

Pflichttextangaben nach § 4 Heilmittelwerbegesetz (HWG)

ASEPTOMAN® Parfümfrei

Wirkstoff: 2-Propanol. Alkoholische Händedesinfektion zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,14 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, gereinigtes Wasser. Enthält Wollwachs.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Wirkspektrum: Bakterizid incl. TbB (Mycobacterium tuberculosis), Levurozid, begrenzt viruzid. Ergebnisse aus In-vitro-Versuchen gegen BVDV und Vaccinia-Virus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. HBV / HIV, HCV.

Gegenanzeigen: Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen: Alkoholische Händedesinfektionsmittel können zu lokalen Überempfindlichkeitsreaktionen führen.

Warnhinweise: Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft, in schweren Fällen Koma. Maßnahmen: Magenspülung, 0 Enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Eine Anwendung bei Säuglingen darf nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Alkoholhaltig, entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Flammpunkt: 23 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. **Stand der Information:** 05/2015

ASEPTOMAN® VIRAL

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel 10 g 1-Propanol (Ph. Eur.)/ 57,6 g Ethanol 96 % pro 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut

Zusammensetzung:

Wirkstoffe: 100 g Flüssigkeit enthalten: 10 g 1-Propanol (Ph. Eur.), 57,6 g Ethanol 96 %. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Butan-1,3-diol, Glycerol, 2-Butanon, Phosphorsäure 85 %, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Parfum Fresh. Enthält Wollwachs und 1,8 g/100g Propylenglycol. Enthält einen Duftstoff mit (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyl-octanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-cyclohex-2-en-1-yl) but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal und Cumarin.

Anwendungsgebiete:

ASEPTOMAN VIRAL wird angewendet zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Anwendung auf Schleimhäuten, im Augenbereich und offenen Wunden nicht geeignet.

Wirkspektrum:

bakterizid (inkl. Mycobacterien), fungizid, viruzid.

Gegenanzeige:

ASEPTOMAN VIRAL darf nicht angewendet werden, bei Allergie gegen 1-Propanol, Ethanol, (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-cyclohex-2-en-1-yl) but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Cumarin oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels.

Nebenwirkungen:

Insbesondere bei mehrfacher Anwendung kann es zu Irritationserscheinungen der Haut (z.B. Austrocknung, Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) und bei hochfrequenter Anwendung auch zu weiter gehenden Hautreizungen mit oberflächlichen Defekten kommen. Das Ausmaß und der Schweregrad dieser Erscheinungen hängen direkt mit der Häufigkeit der Anwendung und der Durchführung angemessener Hautpflegemaßnahmen zusammen. Bei dem ersten Auftreten von Irritationserscheinungen sind die Hautpflegemaßnahmen zu intensivieren. (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7 -dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-cyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal und Cumarin können allergische Reaktionen hervorrufen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von ASEPTOMAN VIRAL: ASEPTOMAN VIRAL darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einen der Inhaltsstoffe von ASEPTOMAN VIRAL sind. Enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Dieses Arzneimittel enthält 1,8 g Propylenglycol pro 100 g. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. ASEPTOMAN VIRAL ist alkoholhaltig und brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte die mit ASEPTOMAN VIRAL eingeriebene Haut gut trocknen lassen. Nicht verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden. Bei versehentlichen Spritzern ins Auge sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal und Cumarin. (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal und Cumarin können allergische Reaktionen hervorrufen.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH,
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld,
T +49 5664 9496-0,
info@schumacher-online.com
Stand der Information: 11/2020

DESCODERM

Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel 2-Propanol 70% (V/V) Lösung
Zul.-Nr.: 1599.98.99

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g; Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge.

Gegenanzeigen:

ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Schumacher GmbH,
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld,
T +49 5664 9496-0,
info@schumacher-online.com
Stand der Information: 09/2017

Produkteigenschaften auf einen Blick

		ASPTOMAN PARFÜMFREI	ASEPTOMAN MED	ASEPTOMAN FORTE	ASEPTOMAN VIRAL	DESCODERM
Wirkungsspektrum	Bakterizid	✓	✓	✓	✓	✓
	Levurozid	✓	✓	✓	✓	✓
	Fungizid			✓	✓	
	Tuberkulozid	✓	✓	✓	✓	✓
	Mykobakterizid	✓	✓	✓	✓	✓
	Begrenzt viruzid	✓	✓	✓	✓	✓
	Begrenzt viruzid PLUS		✓	✓	✓	
	Viruzid			✓	✓	
	Rotaviren		✓	✓	✓	
	Adenoviren		✓	✓	✓	
	Noroviren (MNV)		✓	✓	✓	
	SV40 / Papova- / Polyomaviren				✓	
	Polioviren			✓	✓	
	Vacciniaviren				✓	
	Virusdiarrhoe-Virus (BVDV)				✓	

		ASPTOMAN PARFÜMFREI	ASEPTOMAN MED	ASEPTOMAN FORTE	ASEPTOMAN VIRAL	DESCODERM
Wirkstoffe	1-Propanol				✓	
	2-Propanol	✓				✓
	Ethanol		✓	✓	✓	

		ASPTOMAN PARFÜMFREI	ASEPTOMAN MED	ASEPTOMAN FORTE	ASEPTOMAN VIRAL	DESCODERM
Eigenschaften	Farbstofffrei	✓	✓	✓	✓	✓
	Parfümfrei	✓	✓	✓		✓
	Rückfettend	✓	✓	✓	✓	
	Zusatzstofffrei					✓

		ASPTOMAN PARFÜMFREI	ASEPTOMAN MED	ASEPTOMAN FORTE	ASEPTOMAN VIRAL	DESCODERM
Listungen	VAH	✓	✓	✓	✓	✓
	RKI A				✓	✓
	RKI B				✓	
	ÖGHMP	✓				✓
	IHO	✓	✓	✓	✓	✓

Bestellinformationen

Dr. Schumacher

Händedesinfektionsmittel

Produkt	Gebinde	Verpackungseinheit (VE)	Inhalt	Artikel Nr.	PZN
ASEPTOMAN® PARFÜMFREI	Kittelflasche	20	150 ml	00-403OP-0015-01	09614726
	Spenderflasche	20	500 ml	00-403OP-005	09614637
	Spenderflasche	12	1 L	00-403OP-010	09614583
	Kanister	3	5 L	00-403OP-050	13568216
ASEPTOMAN® MED	Kittelflasche	20	150 ml	00-457OP-0015	16821124
	Spenderflasche	20	500 ml	00-457OP-005	13420821
	Spenderflasche	12	1 L	00-457OP-010	13420809
	Kanister	3	5 L	00-457OP-050	14307340
ASEPTOMAN® FORTE	Kittelflasche	20	150 ml	00-485OP-0015	15190561
	Spenderflasche	20	500 ml	00-485OP-005-01	15190578
	Spenderflasche	12	1 L	00-485OP-010-01	15190584
	Kanister	3	5 L	00-485OP-050-01	15190590
ASEPTOMAN® VIRAL	Kittelflasche	20	150 ml	00-410-0015-02	0142295
	Spenderflasche	20	500 ml	00-410-005	0142303
	Spenderflasche	12	1 L	00-410-010	0142326
DESCODERM	Kittelflasche	20	150 ml	00-401-0015	15231998
	Spenderflasche	20	500 ml	00-401-005	04606366
	Spenderflasche	12	1 L	00-401-010	04606372
	Kanister	3	5 L	00-401-050	04606389



Dr. Schumacher

Fotos: Dr. Schumacher GmbH, Bilder unter Lizenz von Shutterstock.com

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

34323 Malsfeld

Germany

T +49 5664 9496-0

F +49 5664 8444

info@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com



© Dr. Schumacher GmbH, PSP-000079, Version: 11/2021