

Die Haltbarkeiten aller Produkte auf einen Blick

Fläche	nach Produktion	nach Anbruch
DESCOCEPT SPEZIAL	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCOCEPT SENSITIVE	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCOCEPT PUR	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
ULTRASOL OXY	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
ULTRASOL OXY WIPES	18 Monate	42 Tage
ULTRASOL OXY WIPES XL	18 Monate	42 Tage
DESCODERM PADS	36 Monate	
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	24 Monate	42 Tage
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES BIO	24 Monate	42 Tage
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL	24 Monate	42 Tage
DESCOCEPT PUR WIPES RTU	36 Monate	28 Tage
CLEANISEPT WIPES	36 Monate	90 Tage
CLEANISEPT WIPES MAXI	36 Monate	90 Tage
CLEANISEPT WIPES FORTE	18 Monate	28 Tage
CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI	36 Monate	28 Tage
DESCOCEPT SPEZIAL WIPES	36 Monate	28 Tage
ONE SYSTEM PLUS		Standzeit bis zu 60 Tage ¹
ONE SYSTEM BASIC		Standzeit bis zu 60 Tage ¹
DESCO WIPES		Standzeit bis zu 28 Tage ¹
ECO WIPES		Standzeit bis zu 28 Tage ¹
CLEANISEPT	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
BIGUANID FLÄCHE NR	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
OPTISAL N	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
OPTISAL PLUS	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
ULTRASOL ACTIVE	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
OPTISEPT	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit

Instrumente	nach Produktion	nach Anbruch
PLURAZYME EXTRA	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
MANUSHIELD CLEANER	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCO CLEANER	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
PERFEKTAN DUO EFFECT	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
PERFEKTAN ENZYME	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
PERFEKTAN NEU	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
PERFEKTAN TB	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
PERFEKTAN ENDO	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
PERFEKTAN ACTIVE	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCOTON EXTRA	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCOTON FORTE	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
ORANGE SOLVENT	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCO BOHRERBAD	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCO TRAY CLEANER	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCOSUC	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCOSUC CLEANER	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMOSHIELD NR	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMOSHIELD DESINFECTANT	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMOSHIELD XTREME	18 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMOSHIELD FLEX	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMOSHIELD BASIX	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMOSHIELD C	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMOSHIELD P	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMOSHIELD SHINE	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMO CLEAR	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
THERMO ALKA CLEAR	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
SPEZIAL ÖLSPRAY	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit

Haut und Hände	nach Produktion	nach Anbruch
DECONTAMAN PRE SOFT	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DECONTAMAN PRE WASH	24 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DECONTAMAN PRE WIPES	24 Monate	
DECONTAMAN PRE CAP	36 Monate	
ASEPTOMAN PARFÜMFREI	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit ³
ASEPTOMAN MED	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit ³
ASEPTOMAN DUO	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit ³
ASEPTOMAN PLUS	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit ³
ASEPTOMAN FORTE	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit ³
ASEPTOMAN GEL	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit ³
ASEPTOMAN VIRAL	36 Monate	6 Monate
DESCODERM ³	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit ³
DESCODERM HAUTDESINFEKTION	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit ⁴
ASEPTODERM	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
ASEPTODERM GEFÄRBT	36 Monate	bis Ende Verwendbarkeit
DESCOLIND COMFORT WASH	36 Monate	12 Monate ²
DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM	36 Monate	12 Monate ²
DESCOLIND PURE WASH	36 Monate	12 Monate ²
DESCOLIND PURE LIGHT CREAM	36 Monate	12 Monate ²
DESCOLIND PURE INTENSIVE CREAM	18 Monate	bis Ende Verwendbarkeit ²
DESCOLIND EXPERT WASH	24 Monate	12 Monate ²
DESCOLIND EXPERT LIGHT CREAM	36 Monate	12 Monate ²
DESCOLIND EXPERT INTENSIVE CREAM	36 Monate	12 Monate ²
DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM	36 Monate	12 Monate ²
DESCOCOM BARRIERECREME	36 Monate	12 Monate
DESCOCOM ÖLBAD	30 Monate	12 Monate
DESCO VITAL	36 Monate	6 Monate
CARE ZONE BABY WIPES	30 Monate	3 Monate
DESODERM CARE WIPES	30 Monate	3 Monate
DESCOLIND CARE WIPES	24 Monate	

¹ Standzeit der Tränklösung beachten.

² Haltbarkeit nach Anbruch im fest verschlossenen Spender beträgt 12 Monate unter der Voraussetzung, dass der Spender in hygienisch einwandfreiem Zustand ist und gehalten wird. Haltbarkeit im ESH Vacu-Bag bis Ende der Verwendbarkeit.

³ Haltbarkeit nach Anbruch im Spender beträgt 6 Monate unter der Voraussetzung, dass der Spender in hygienisch einwandfreiem Zustand ist und gehalten wird.

Haltbarkeit im Gebinde oder im luftdicht abschließenden Spendersystem (z. B. ESH Vacu-Bag) bis Ende der Verwendbarkeit.

⁴ Haltbarkeit nach Anbruch bis Ende der Verwendbarkeit unter der Voraussetzung, dass Produkt und Verschlusskappe in einem hygienisch einwandfreien Zustand gehalten werden.

Pflichttextangaben nach § 4 Heilmittelwerbe-gesetz (HWG)

ASEPTOMAN® PARFÜMFREI

63,14 g 2-Propanol pro 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut. Alkoholische Händedesinfektion. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 2-Propanol 63,14 g. Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, gereinigtes Wasser. Enthält Wollwachs. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Wirkpektrum:** bakterizid, mykobakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid* Ergebnisse aus In-Vitro-Versuchen gegen BVDV und Vacciniavirus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. HBV/HIV, HCV. **Gegenanzeigen:** Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Alkoholische Händedesinfektionsmittel und Wollwachs können zu lokalen Unverträglichkeitsreaktionen führen. **Warnhinweise:** Enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft, in schweren Fällen Koma. Maßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; sonst symptomatisch. Enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Eine Anwendung bei Säuglingen darf nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Alkoholhaltig, entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Flammpunkt: 23 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Stand: 03/2023.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

ASEPTOMAN® VIRAL

Alkoholische Händedesinfektionsmittel 10 g 1-Propanol (Ph. Eur.)/ 57,6 g Ethanol 96 % pro 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** Wirkstoffe: 100 g Flüssigkeit enthalten: 10 g 1-Propanol (Ph. Eur.), 57,6 g Ethanol 96 %. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Butan-1,3-diol, Glycerol, 2-Butanon, Phosphorsäure 85 %, Lanolin-poly(oxyethylen)-75. Enthält Wollwachs und 1,8 g/100g Propylenglycol. **Anwendungsgebiete:** Hygienischen Händedesinfektion. **Wirkpektrum:** bakterizid (inkl. Mykobakterien), levurozid, viruzid. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Allergie gegen die Wirkstoffe oder gegen einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (z. B. Austrocknung, Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) kommen. Bei hochfrequenter Anwendung kann es zu weitergehenden Hautreizungen mit oberflächlichen Defekten kommen. Ausmaß und der Schweregrad hängen direkt mit der Häufigkeit der Anwendung und der Durchführung angemessener Hautpflegemaßnahmen zusammen. Bei dem ersten Auftreten von Hautirritationen sind die Hautpflegemaßnahmen zu intensivieren. **Warnhinweise:** Zur Anwendung auf Schleimhäuten, im Augenbereich und offenen Wunden nicht geeignet. Bei versehentlichem Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten sofort gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nicht verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Aseptoman viral ist alkoholhaltig und brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte die mit Aseptoman viral eingeriebene Haut gut trocknen lassen. Enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. Stand: 06/2024.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

ASEPTOMAN® DUO

50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol pro 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Triglyceride, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Alkoholische Händedesinfektionsmittel, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS (zusätzlich Adeno-, Noro- und Rotaviren). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht auf Schleimhäuten oder im Augenbereich anwenden. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Brennen) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. **Warnhinweise:** Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten! Die Flasche fest verschlossen halten und vor Hitze geschützt aufbewahren. Bei Anwendung nicht rauchen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der Lösung, Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Stand: 12/2023.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld, Tel. 05664/9496-0, info@schumacher-online.com

ASEPTODERM®

Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel zum Besprühen oder Betupfen der Haut. Wirkstoff: 2-Propanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,14 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionen. **Wirkpektrum:** Bakterizid inkl. Tbc (Mycobacterium tuberculosis), levurozid, begrenzt viruzid. Ergebnisse aus In-vitro-Versuchen gegen BVDV und Vaccinia-Virus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. HBV / HIV, HCV. **Gegenanzeigen:** Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Nicht anwenden bei Allergie gegen 2-Propanol oder gegen einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Brennen) kommen. Auch Kontaktallergien sind möglich. **Warnhinweise:** Alkoholhaltig, entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Flammpunkt: 23 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Stand: 11/2024

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

ASEPTODERM® GEFÄRBT

Wirkstoff: 2-Propanol. Alkoholische Hautdesinfektion zum Besprühen oder Betupfen der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,14 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, Duftstoffe, Tartrazin (E 102), Erythrosin (E 127), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionen*. Bakterizid (inkl. Tbc (Mycobacterium tuberculosis), levurozid, begrenzt viruzid. Ergebnisse aus In-vitro-Versuchen gegen BVDV und Vaccinia-Virus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. HBV / HIV, HCV). *Die Untersuchungen gemäß „Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren“ wurden nur mit dem ungefärbten Präparat durchgeführt. **Gegenanzeigen:** Nicht auf der Schleimhaut, oder im Augenbereich anwenden. Nicht anwenden bei Allergie gegen 2-Propanol, Tartrazin (E 102) oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Brennen) kommen. Tartrazin kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Auch kontaktallergische Reaktionen sind möglich. Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft; in schweren Fällen Koma. Maßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; sonst symptomatisch. **Warnhinweise:** Dieses Arzneimittel enthält den Farbstoff Tartrazin (E 102), der bei besonders empfindlichen Personen allergieartige Reaktionen hervorrufen kann. Eine mögliche Kontaktsensibilisierung von Tartrazin (E 102) und Erythrosin (E 127) wurde nicht untersucht. Alkoholhaltig, entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Flammpunkt: 23 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Stand: 11/2024.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com